

Examen partiel du 29/03/2007

- 1) Soient A un anneau commutatif et B une A -algèbre (non nécessairement commutative). On note ε l'image de X dans $A[X]/(X^2)$ et $A[\varepsilon] = A[X]/(X^2)$.
- a) Montrer que $B \otimes_A A[\varepsilon]$ est un B -module libre de base $1 \otimes 1, 1 \otimes \varepsilon$. On note $B[\varepsilon] = B \otimes_A A[\varepsilon]$.
- b) Soit C une A -algèbre. Montrer que les morphismes de A -algèbres $B \rightarrow C[\varepsilon]$ sont en bijection avec les couples (f, D) , où $f : B \rightarrow C$ est un morphisme de A -algèbres et $D : B \rightarrow C$ est une f -dérivation, c'est-à-dire une application A -linéaire qui vérifie

$$D(xy) = D(x)f(y) + f(x)D(y)$$

pour tous x, y dans B .

- c) Une *dérivation de B* est une $\mathbf{1}_B$ -dérivation. Montrer que les dérivations de l'algèbre tensorielle $T(M)$ sur un A -module M sont en bijection canonique avec les morphismes de A -modules de M dans $T(M)$.
- d) Supposons que B est une A -algèbre commutative. Montrer que l'ensemble des dérivations de B admet une structure naturelle de B -module. Montrer que si B est l'algèbre symétrique sur un A -module libre de rang fini n , ce module est libre de rang n .
- 2) Déterminer le groupe de Galois des équations suivantes :
- a) $t^4 + 4t^3 + 2t^2 + 3t - 5$ sur \mathbb{Q} ;
- b) $t^3 - 3\lambda t - \lambda - \lambda^2 = 0$ sur $\mathbb{C}(\lambda)$, où λ est une indéterminée ;
- c) $t^6 - 3t^2 + 1 = 0$ sur \mathbb{Q} ;
- d) $t^6 - 4t^2 - 1 = 0$ sur \mathbb{Q} .
- 3) a) Déterminer l'entier positif minimal n tel que le corps de décomposition L du polynôme $X^n - 1$ sur \mathbb{Q} contient une sous-extension E de degré 3 sur \mathbb{Q} . Montrer que cette sous-extension est unique.
- b) Montrer que E est galoisienne et exhiber un polynôme irréductible unitaire à coefficients entiers dont c'est le corps de décomposition.
- 4) Soient K un corps et L une extension finie normale de K . Montrer qu'il existe une sous-extension E de L telle que L est galoisienne sur E et les éléments de E n'appartenant pas à K sont tous inséparables sur K .