

# Analyse TD 2

J. Rocher

Jeudi 30 mars 2006

## 1 Fonctions usuelles

### 1.1 exponentielles, logarithmes

1. Montrer que  $\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) + \ln(\sqrt{1 + x^2} - x) = 0$ .
2. Résoudre  $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$  dans  $\mathbb{R}$ .

### 1.2 fonctions trigonométriques et réciproques

1. Calculer  $\tan(\arcsin x)$ ,  $\sin(\arccos x)$ ,  $\cos(\arctan x)$ , pour tout  $x$  où ceci a un sens.
2. Résoudre les équations suivantes ( $x$  réel) :
  - .  $\arctan x + \arctan 2x = \frac{\pi}{4}$
  - .  $\arcsin 2x - \arcsin x\sqrt{3} = \arcsin x$
3. Calculer  $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$ ,  $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$  et  $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ .

Indication pour le dernier : remarquer que  $\cos\left(-\frac{4\pi}{5}\right) = \cos\left(\frac{6\pi}{5}\right)$  puis simplifier l'équation obtenue.

### 1.3 trigonométrie hyperbolique

**Présentation** : On définit les fonctions sh, ch et th (respectivement sinus, cosinus et tangente hyperboliques) par les formules ( $x \in \mathbb{R}$ ) :

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x},$$

Les exercices suivants se suivent et vont vous permettre de faire plus ample connaissance avec ces fonctions.

1. Étudiez ces fonctions (signes, parité, variations, comportement en 0 et à l'infini). Tracez-en le graphe. Prouvez la *relation fondamentale de la trigonométrie hyperbolique* :  $\operatorname{ch}^2 - \operatorname{sh}^2 = 1$ .
2. On définit les *fonctions hyperboliques réciproques*  $\operatorname{argsh}$ ,  $\operatorname{argch}$  et  $\operatorname{argth}$  (respectivement arguments sinus, cosinus et tangente hyperboliques) comme étant les réciproques des restrictions des fonctions ci-dessus au plus grand intervalle possible contenant 1. Calculez explicitement ces fonctions.
3. Calculez  $\operatorname{ch}(a + b)$  en fonction des images de  $a$  et  $b$  par les fonctions cosinus et sinus hyperbolique. De même pour  $\operatorname{sh}(a + b)$ .

## 2 Limites, continuité ponctuelle

### 2.1 généralités

1. Montrer que si une fonction périodique admet une limite en l'infini, elle est constante.

2.\* Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^+$ . La proposition «Si pour tout  $x > 1$  la suite  $f(nx)$  tend vers 0 alors  $f$  a pour limite 0 en l'infini» est fautive. Construire un contre-exemple.

Indication : ne pas chercher à avoir  $f$  continue. Pensez arithmétique!

3. Soit  $f$  la fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  telle que si  $x$  est rationnel,  $f(x) = 1$ , et  $f(x) = 0$  sinon. Montrer que  $f$  est partout discontinue.

4.\* Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  nulle en tout point irrationnel, valant 1 en 0, et valant  $\frac{1}{q}$  en tout autre rationnel s'écrivant  $\frac{p}{q}$  sous forme irréductible. Montrer que  $f$  est discontinue en tout point de  $\mathbb{Q}$  et continue en tout point de  $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ .

5. Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  et continue en 0, telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x).$$

Montrer que  $f$  est constante.

### 2.2 calculs

Déterminer les limites suivantes

a)  $\frac{x^2 + 1}{\sin^2 x}$  en 0,

b)  $x E\left(\frac{1}{x}\right)$  en  $0^+$ ,

c)  $\frac{\tan 3x}{\sin x}$  en 0,

d)  $\text{th}(\arctan x)$  en  $+\infty$ ,

d)  $\sin \frac{1}{x}$  en  $0^+$ ,

e)  $x^x$  en  $0^+$ ,

f)  $\frac{x + 2}{x^2 \ln x}$  en 0.